

Il foglietto illustrativo si riferisce a liquidi premiscelati con nicotina (3mg/ml; 6mg/ml; 9mg/ml; 12mg/ml; 16mg/ml; 18mg/ml), utilizzabili con dispositivi elettronici di vaporizzazione. **Istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto.** I liquidi per sigaretta elettronica devono essere utilizzati solo con vaporizzatori personali e non devono essere miscelati per nessun motivo con altri liquidi, con altre sostanze o miscele con altra destinazione d'uso. Il prodotto non è da intendersi come terapia sostitutiva per la disassuefazione da nicotina. Conservare lontano da alimenti, da mangimi, da bevande. Chiudere sempre il flacone dopo l'utilizzo. Conservare al riparo dalla luce solare diretta e da fonti di calore. Conservare a temperatura inferiore a 30°C. **Caratteristiche del flacone.** LDPE 50% - HDPE 50% (polietilene a bassa/alta densità). Il flacone, capacità 10ml.

- LDPE (polietilene a bassa densità). Il contagocce di diametro 2mm (Ø, 2mm), inserito nel collo della bottiglia.
- HDPE (polietilene ad alta densità) il tappo. Il tappo è child proof / a prova di bambino.

Meccanismo di apertura. Non usare il prodotto se il sigillo di garanzia è rotto; spingere il tappo verso il basso; mantenere la pressione e svitare in senso antiorario prima di riporto, rimettere il tappo spingendo verso il basso ed avvitare in senso orario; assicurarsi che il tappo sia ben chiuso dopo l'uso. **Meccanismo di riempimento del vaporizzatore.** Aprire il flacone come sopra descritto; inserire il contagocce nel foro di ricarica del vaporizzatore; premere il flacone in modo da far fuoriuscire il liquido dal contagocce verso il foro di ricarica del vaporizzatore; prima di riporto, rimettere il tappo premendolo verso il basso ed avvitare in senso orario; assicurarsi che il tappo sia ben chiuso dopo l'uso; chiudere il foro di ricarica del vaporizzatore. **Capacità di indurre dipendenza e tossicità.** Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai giovani ed ai non fumatori. Per evitare il sovradosaggio è consigliabile non utilizzare i liquidi contenenti nicotina in concomitanza con sigarette tradizionali, sigari, pipe, cerotti, etc. **Avvertenze per specifici gruppi a rischio.** L'uso del prodotto non è raccomandato nei seguenti casi: se avete meno di 18 anni di età; se non siete fumatori;

se in gravidanza ed allattamento; se siete allergici alla nicotina o alle sostanze presenti nel prodotto; in caso di concomitante assunzione di altri prodotti contenenti nicotina (comprese, gomme da masticare, cerotti, etc); se siete diabetici; se soffrite di patologie bronchiali o polmonari; se ritenete che le vostre condizioni di salute non vi rendano idonei all'utilizzo del prodotto. **Informazioni su eventuali effetti nocivi.** L'assunzione eccessiva di nicotina può provocare: nausea, malessere, vomito, vertigini, mal di testa, depressione, irritazione del cavo orale e della gola, congestione nasale, bocca secca, sensazione di sete, tosse, mancanza di respiro; febbre, dolori pettorali, tachicardia, aritmia. Reazioni allergiche, quali eruzioni cutanee, orticaria, gonfiore di viso, labbra, cavo orale, respirazione difficoltosa. Nel caso si manifestassero questi, o altri sintomi non elencati, durante o dopo l'uso del prodotto, consultare un medico o un centro antiveleni. **Controindicazioni.** Questo prodotto non è indicato in caso di: allergia alla nicotina o ad altri ingredienti contenuti nel liquido; assunzione di farmaci con i quali la nicotina potrebbe interagire o interferire; condizioni mediche che includono, ma non si limitano a, malattie cardiache, diabete, ipertensione, asma, malattie epatiche o renali, disturbi psichiatrici, gastrite, ulcera gastrica e/o reflusso gastro-esofageo; dubbi sul corretto utilizzo del prodotto. **Informazioni supplementari.** In caso di necessità, si segnalano i recapiti telefonici di alcuni centri antiveleni: Cavp "Osp. pediatrico bambino Gesù" - Roma. tel. 06-68593726 Az. Osp. univ. Foggia - Foggia. tel. 0881-732326 Az. Osp. "A. Cardarelli" - Napoli. tel. 081-7472870 Cav policlinico "Umberto I" - Roma. tel. 06-49978000 Cav policlinico "A. Gemelli" - Roma. tel. 06-3054343 Az. Osp. "Careggi" U.O. tossicologia medica - Firenze. tel. 055-7947819 Cav centro nazionale di informazione tossicologica - Pavia. tel. 0382-24444 Osp. Niguarda Ca' Granda - Milano. tel. 02-66101029 Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Bergamo. tel. 800-883300. Prodotto da: L'Erboristeria Sri - Via Enrico Forlanini 10/12 - 00012 Guidonia Montecelio (RM) - info@latabaccheria.net - www.latabaccheria.net - Tel. +39 0774688167